





CIRCULAR N°1: TRATAMIENTO PREFLORAL Y PLENA FLORACIÓN


1.- MELOCOTONERO:

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Producto	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 <p>Botón rosa</p>	Pulgón	Thianosan	250 g	15	<p>En variedades muy sensibles a oidio tratar con CADDY 10</p> <p>Se puede añadir PROMEX a la dosis de 50 cc/100 l contra Piojo</p>
	Anarsia	Crostiuram	+		
	Cribado	Confidor	75 cc	15	
	Oidio	Volck	1000 cc	NP	
	Piojo de San José	Dominex	15 cc	21	
 <p>Plena floración</p>	Trips	Mavrik	100 cc	NP	En plena floración controlar población de trips y realizar tratamiento según presión de plaga, especialmente en variedades de nectarina susceptibles de ser atacadas.
	Monilia	Folicur	100 g	7	En variedades con problemas en años anteriores o condiciones favorables de desarrollo.



2.- ALBARICOQUERO


Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Producto	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Botón rosa	Anarsia Cribado Monilia	Dominex + Thianosan + Volck	15 cc 250 g 1000 cc	21 15 NP	
 Plena floración	Monilia	Folicur + Kaliter Microquel	100 g 500 cc	7	Gran sensibilidad a Monilia en este momento. Zn y Mn vía foliar para mejorar el cuajado.

3.- CEREZO

 Botón blanco	Piojo de San José Pulgón Orugas Bacteriosis	Dominex + Confidor + Cuprafor + Volck	15 cc 50 cc 400 g 1000 cc	21 28 NP NP	
---	--	---	--	----------------------------------	--

4.- PERAL

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Producto	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Aparición de botones florales	Regulador de crecimiento	Brotanol Volck	Ver anexo1 1000 cc		
 80% de botón blanco	Moteado Pseudomonas Hoplocampa Psila Janus Cigarrero Piojo de San José	Cuprafor + Confidor + Volck Juvinal	400 g 75 cc 1000 cc 50 cc	NP 15 NP NP	Importante momento de aplicación para tener buen efecto para Psila, inicio de nascencia de las ninfas. Control de evolución de huevos.

 <p>Plena floración</p>	Moteado	Caddy 10	18 g	14	Puede mezclarse con los hormonales solo en condiciones de humedad
	Cuajado	Berelex o Fruitone o Promalin + Calypso + Folicur	30cc + 50 g	14 14	Consultar dosis de los hormonales con el departamento técnico. Muy importante para Psila

ANEXO 1

Regulador de crecimiento (BROTANOL) para las peras en función VIGOR Y PREVISIÓN CUAJADO

Previsión de cuajado (Cantidad botón de flor/Vigor árbol)	Bajo	Medio	Alto
Excelentes/Buenas	0-0.5 L x 1000 L	0.75-1 L x 1000 L	1.5-2 LI x 1000 L
Regulares/Malas	0.5-0.75 L x 1000 L	1-1.5 L x 1000 L	2-2.5 L x 1000 L