





CIRCULAR Nº 2: TRATAMIENTO DE CAÍDA DE PÉTALOS Y PREFLORAL DE MANZANO



1.- MELOCOTONERO:

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Inicio caída de pétalos	Oidio				
	Monilia	Caddy	15 g	15	
	Abolladura	+ Thianosan	250 g	15	
	Cribado	+ Reldan	400 cc	15	
	Trips	ó Chas 25	400 g	21	
	Pulgón				
	Anarsia				
 Caída de collarín	Oidio	Flint	15 g	7	Tratar transcurridos 10-12 días del tratamiento anterior.
	Monilia	+ Elosal o Microtox	500 gr	5	En presencia de pera blanquilla en los alrededores, sustituir el RIOZEB por THIANOSAN.
		+ Riozeb	250 gr	28	
	Trips				
		Teppeki	14 gr	14	Si hubiera pulgon verde



2.- ALBARICOQUERO

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Inicio caída de Pétalos	Oidio Abolladura Cribado Anarsia	Caddy + Thianosan + Decis Protech	15 g 250 g 80 cc	15 15 3	Según condiciones y sensibilidad de la variedad a problemas de Oidio
 Caída de collarín	Oidio Cribado Monilia	Folicur + Riozeb	100 g 250 g	7 28	



3.- CEREZO

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Plena floración	Monilia	Folicur	75 g	7	Tratar si hay lluvias o condiciones favorables para el desarrollo del hongo
 Caída total de pétalos	Monilia Pulgón	Confidor + Folicur + Thianosan	50 cc 75 g 250 g	28 7 15	

4.- PERAL

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Inicio caída de pétalos	Psila Stemphiliium Moteado	Caddy + Cal-ex + Volck	15 g 100 cc 200 cc	15 10 NP	MUY IMPORTANTE realizar la mezcla de abamectina con aceite previamente, antes de añadir a la cuba.
 Caída total de pétalos	Moteado Stemphiliium	Thianosan + Flint	250 g 15 g	35 14	Si hay precipitaciones después del tratamiento anterior. (Ver anexo 1) Tratamiento muy importante en variedades sensibles a stemphiliium.

5.- MANZANO

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 80% de botón rosa	Moteado Oidio Pulgón Piojo de San José	Caddy + Juvinal + Confidor + Volck	15 gr 50 cc 50 cc 1000 cc	15 NP 15 NP	
 Plena floración	Moteado Oidio Cuajado Aclareo	Folicur + Regalis + CUAJADO Y ACLAREO	75 g 150 g	14 55	Tratar si hay condiciones favorables para la infección. (Ver anexo 1) Regulador de crecimiento (si es necesario, importante hacerlo en este momento). (Consultar con su técnico correspondiente)

ANEXO 1: MOTEADO Y STEMPHILIUM (Condiciones óptimas y niveles de infección):

Siendo la temperatura óptima de desarrollo del hongo de 12-25 °C también puede desarrollarse entre 1-28°C si las horas de humectación son las suficientes.

Infección ligera 9-11 horas de humectación a temperatura entre 12-25 °C

Infección moderada 12-14 horas de humectación a temperatura entre 12-25 °C

Infección grave 19-20 horas de humectación a temperatura entre 12-25 °C

Sensibilidad de las variedades a ser afectadas por MOTEADO:

PERAL			MANZANO	
Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Sensibilidad Baja	Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media
Blanquilla, Castells, Bartlett, Magallon	William's, Decana Del congreso Ercolini, Canyella, Morettini	Conference, Passa Crassana, Alejandrina, Llimonera, Flor de invierno, Kaiser, Abate Fetel, Buena Luisa, Gran Champion	Belleza de Roma, Fuji, grup Delicius Vermelles, Grupo Golden Delicius, grup Gales	Granny Smith

Sensibilidad de las variedades a ser afectadas por STEMPHILIUM:

Sensibilidad ALTA: Conference, Alejandrina y Abate fetel.

Condiciones de infección muy similar a moteado.