



### Tratamiento de caída de hoja para FRUTALES DE HUESO

Época de Tratamiento	Control o acción	Nombre Comercial	Dosis / 1000 l	P.S. (días)	Observaciones:
En variedades con problemas de <i>Fusicoccum</i> y <i>Monilia</i> durante la campaña, realizar un tratamiento al comienzo de la caída de la hoja.					
2 tratamientos: 1º- 25-50% hoja caída	Fusicoccum, monilia, cribado, abolladura y bacteriosis.	CUPRAFOR	4 kg	n.p.	
		THIANOSAN	2.5 kg	15	
2º- 50-100% hoja caída Solo Cuprafor	En albaricoque, cerezo y ciruelo, para cuajado del próximo año.	KALITER BORO	2.5 l		

**NOTA INFORMATIVA:** Debido a la detección de la bacteria *XANTHOMONAS ARBORICOLA* en diversas plantaciones del Bajo Cinca es **IMPORTANTE** consultar con su técnico para ajustar el momento de tratamiento, especialmente en las parcelas infectadas y alrededores.

### Tratamiento de caída de hoja para FRUTALES DE PEPITA

Época de Tratamiento	Control o acción	Nombre Comercial	Dosis / 1000 l	P.S. (días)	Observaciones:
75-80% hoja caída	Moteado, septoriosis y bacteriosis	CUPRAFOR + KALITER BORO	4 kg  2.5 l	n.p.	

## TRATAMIENTO OLIVO

Época de Tratamiento	Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 1000 litros	P.S. (días)	Observaciones:
Inmediatamente después de la recolección	Repilo ( <i>Spilocaea oleaginae</i> ) y tuberculosis	CUPRAFOR + KALITER BORO	4 kg  2.5 l	15  n.p.	Es importante mojar bien ya que interesa tanto desinfectar las heridas provocadas por la recolección como para prevenir los daños por heladas. El BORO es esencial para mejorar el cuajado de frutos al año siguiente.